

보건복지부 고시 제2014-34호, 2014.2.26. (2014년 3월 1일 시행)

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법
고지혈증치료제	<p>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에 투여한 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 순수 고저밀도지단백콜레스테롤(LDL-C)혈증</p> <p>1) 투여대상</p> <p>가) 위험요인*이 0~1개인 경우: 혈중 LDL-C\geq160 mg/dL일 때</p> <p>나) 위험요인*이 2개 이상인 경우: 혈중 LDL-C\geq130 mg/dL일 때</p> <p>다) 관상동맥질환 또는 이에 준하는 위험(말초동맥질환, 복부대동맥류, 증상이 동반된 경동맥질환, 당뇨병)인 경우: 혈중 LDL-C\geq100 mg/dL일 때</p> <p>라) 급성 관동맥 증후군인 경우: 혈중 LDL-C\geq70 mg/dL일 때</p> <p>2) 해당 약제: HMG-CoA 환원효소억제제, 담즙산제거제, Fibrate계열 약제 중 1종</p> <p>나. 순수 고트리글리세라이드(TG)혈증</p> <p>1) 투여대상</p> <p>가) 혈중 TG\geq500 mg/dL일 때</p> <p>나) 위험요인*또는 당뇨병이 있는 경우: 혈중 TG\geq200 mg/dL일 때</p> <p>2) 해당 약제: Fibrate 계열, Niacin 계열 중 1종</p> <p>다. 고LDL-C 및 고TG혈증 복합형</p> <p>1) 투여대상</p> <p>“가. 순수 고LDL-C혈증”과 “나. 순수 고TG혈증”에 해당하는 경우</p> <p>2) 해당 약제</p> <p>LDL-C 및 TG에 작용하는 약제별로 각각 1종씩 인정</p> <p>라. 약제투여는 치료적 생활습관 변화(therapeutic lifestyle changes)를 병행하여 실시토록 권장함</p> <p>* 위험요인</p> <p>① 흡연</p> <p>② 고혈압(BP\geq140/90 mmHg 또는 항고혈압제 복용)</p>

구 분	세부인정기준 및 방법
	③ 낮은 고밀도지단백콜레스테롤(HDL-C)(<40 mg/dL) ④ 관상동맥질환 조기 발병의 가족력(부모, 형제자매 중 남자 <55 세, 여자 <65 세에서 관상동맥질환이 발병한 경우) ⑤ 연령(남자 ≥ 45 세, 여자 ≥ 55 세) ※ HDL-C ≥ 60 mg/dL은 보호인자로 간주하여 총 위험요인 수에서 하나를 감한다.

II. 약제 2. 약제별 세부인정 기준 및 방법 [변경]

보건복지부 고시 제2015-18호, 2015.01.26. (2015년 2월 1일 시행)

[218] 동맥경화용제

구 분	세부인정기준 및 방법
Omega-3-acid ethyl esters 90 경구제 (품명 : 오마코연질 캡슐 등)	<p>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 영양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 순수 고평리글리세라이드(TG)혈증 또는 고LDL-C 및 고TG혈증 복합형의 경우로서, 적절한 식이요법을 함에도 불구하고 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1) 혈중 TG≥ 500 mg/dL인 경우 1일 4g까지 인정</p> <p>2) 위험요인* 또는 당뇨병이 있는 경우: 혈중 TG≥ 200 mg/dL일 때 기존 유사 대체 약제(Fibrate 또는 Niacin계열) 사용시 부작용이 예상되는 경우 1일 4g까지 인정</p> <p>나. 순수 고TG혈증의 경우에는 단독요법으로 인정하며, 복합형의 경우에는 “고지혈증치료제 일반원칙”에 명시한 LDL-C 및 TG에 작용하는 약제별로 각각 1종씩 인정</p> <p>* 위험요인</p> <p>① 흡연</p> <p>② 고혈압(BP$\geq 140/90$ mmHg 또는 항고혈압제 복용)</p> <p>③ 낮은 고밀도지단백콜레스테롤(HDL-C)(<40 mg/dL)</p> <p>④ 관상동맥질환 조기 발병의 가족력(부모, 형제자매 중 남자<55세,</p>

	<p>여자<65세에서 관상동맥질환이 발병한 경우)</p> <p>⑤ 연령(남자\geq45세, 여자\geq55세)</p> <p>※ HDL-C\geq60 mg/dL은 보호인자로 간주하여 총 위험요인 수에서 하나를 감한다.</p>
--	--